



血管張力素 II 受體拮抗劑用藥指導單張

藥衛 075

血管張力素 II 受體拮抗劑之單方藥品

學名	英文商品名	中文商品名	劑量	圖片
Irbesartan	Aprovel	安普諾維錠劑	300 mg	Aprovel 300mg Tab 安普諾維錠劑 
Candesartan	Blopress	博脈舒錠劑	8 mg	BLOPRESS 8 mg 博脈舒錠劑 
Valsartan	Diovan	得安穩膜衣錠	160 mg	Diovan FC 160mg Tab 得安穩膜衣錠 
Azilsartan Medoxomil	Edarbi	易得平錠	40mg	Edarbi 40mg 易得平錠 
Olmesartan	Olmotec	雅脈膜衣錠	40 mg	OLMETEC FC 40mg 雅脈膜衣錠 

血管張力素 II 受體拮抗劑之複方藥品

Amlodipine/ Valsartan	Exforge	易安穩膜衣錠	5/80 mg	Exforge 5/80mg Tab 易安穩 5/80 膜衣錠 
Losartan/ Hydrochlorothiazide	Hyzaar	好悅您膜衣錠	100/12.5 mg	Hyzaar FC 100/12.5 MG TAB 好悅您膜衣錠100/12.5毫克 
Amlodipine/ Olmesartan	Sevikar	舒脈康膜衣錠	5/20mg	Sevikar 5/20mg FC Tab 舒脈康膜衣錠 
Amlodipine/ Telmisaetan	Twynsta	倍必康平錠	5/80 mg	Twynsta Tablets 80/5 mg 倍必康平錠 

一、為什麼要使用這些藥？

用於高血壓及心臟衰竭等相關疾病。複方藥品合併利尿劑(Hydrochlorothiazide)或鈣離子阻斷劑(Amlodipine)，具協同降壓效果。

二、如何使用這些藥？

請以白開水服用，且須遵從醫師處方用藥，不可自行更改劑量或自行停藥。

三、使用期間該注意些什麼？

1. 服藥前，請確認是否對此類成分過敏，若發生血管性水腫情況，應立即告知醫師。
2. 若已經在服用其它藥物，如利尿劑、鋰劑、鉀補充劑或其他降血壓藥物等，應告知您的醫師，避免影響其它藥品藥效。
3. 如果您有或曾經有腎、心臟、糖尿病等疾病，應告知您的醫師。
4. 如果您於服藥期間正懷孕或計劃懷孕、餵母乳，請事先告知您的醫師。

四、可能引起的副作用？

常見情形：頭暈、姿態性暈眩、低血壓、姿態性低血壓等。

少見情形：高血鉀、頭痛、暈厥、咳嗽、腹瀉、腎功能不全、過敏反應、血管性水腫等。

五、忘記使用怎麼辦？

想起時，請立刻補服一次劑量，若是很接近下次服藥時間，則跳過一次，依原來時間服用下一次的劑量，絕不可一次服用雙倍藥量，並請告知醫師。

六、此藥儲存時的條件為何？

室溫儲存。

*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，
請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604 或 5605