



血管收縮素轉化酶抑制劑用藥指導單張(ACE inhibitor)

藥衛 071

學名	英文商品名	中文商品名	劑量	圖片
Amlodipine /Benazepril	Amtrel (複方)	諾壓錠	5 mg/10 mg	
Captopril	Ceporin	血樂平錠	25 mg	
Fosinopril	Fonosil	壓速利錠	10 mg	
Enalapril Maleate	Synbot	欣保錠	20 mg	
Imidapril HCl	Tanatril	田納滋錠	5 mg	
Ramipril	Tritace	心達舒錠	2.5 mg	
Ramipril	Tritace	心達舒錠	10 mg	

一、為什麼要使用這些藥？

本類藥品是用以治療高血壓及心臟衰竭。

二、如何使用這些藥？

每日服用本類藥品的次數及每次劑量，請遵照醫囑。Ceporin建議空腹時，以白開水吞服。

三、使用期間該注意些什麼？

1. 服用本類藥，若疑有懷孕應立即與醫師聯絡。
2. 服用本類藥不建議哺餵母乳，必要時請與醫師或藥師討論。
3. 如果您有限鉀或低鈉飲食、喝酒習慣或曾有其他健康上的問題，特別是有糖尿病、紅斑性狼瘡、肝臟、腎臟或腎臟移植等疾病，請告知醫師。
4. 必須按時回診、定期量血壓及做相關檢查，以確定本類藥品對您的療效。服藥期間應遵守高血壓飲食控制原則；使用鹽的替代品或低鹽產品前務必先請教醫師。
5. 當從睡姿或坐姿欲站立時，記得要緩慢，以避免發生暈眩及頭痛。
6. 服用本類藥品期間，可能會有暈眩產生，應儘量避免開車、操作機械或從事具有危險性的工作。
7. 酒精會干擾本類藥品的降血壓作用，或增加眩暈、虛弱等副作用的發生，請避免飲用酒精性飲料。

四、可能引起的副作用？

1. 如果有呼吸急促、困難、臉部或四肢水腫，請立刻告知醫師。
2. 如果持續乾咳、頭痛、疲倦、腹瀉等，若發生一段時間後，症狀仍持續惡化，請儘快通知醫生。
3. 若有噁心感出現時，可與食物牛奶一起服用；若仍無法改善，請告知醫師。
4. 若有頭暈、頭昏眼花、特別是由床上或椅子上坐起時，起身的動作放慢可以改善；若會昏厥，請立刻停藥告知醫師。

五、忘記使用怎麼辦？

想起時，立即服用；若已接近或已到下一次服藥時間，只需服用下一次藥量，切勿同時服用兩次的劑量。

六、此藥儲存時的條件為何？

請連同藥袋或是原包裝儲存於密閉容器內，於室溫、乾燥處避光保存；避免置放於孩童可以取得的場所。

*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，
請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604 或 5605