

抗血小板藥物用藥指導單張

藥衛 002

學名	英文商品名	中文商品名	劑量	圖片
Aspirin	Bokey	伯基	100 毫克	
	Aspirin Protect	阿斯匹林	100 毫克	
	Ropal	熱痛寧	100 毫克	
Ticlopidine	Licodin	利血達	100 毫克	
Clopidogrel	Plavix	保栓通	75 毫克	
	Clopidogrel	舒栓寧	75 毫克	
Ticagrelor	Brilinta	百無凝	90 毫克	

一、為什麼要使用這些藥？

防止血小板凝集降低血栓發生的機會，減少血管阻塞、心肌梗塞、中風發生的風險。

二、使用這些藥品，有哪些情形該事先告知醫師？

1. 如果您曾經對此藥物過敏者。
2. 如果曾有消化性潰瘍病史或使用抗凝血劑、消炎止痛藥者。
3. 肝、腎功能不佳者。
4. 任何手術或拔牙前，請告知醫師或牙醫師正在接受服用本藥。

5. 孕婦或有計畫懷孕的婦女在使用此藥前一定要告知醫師。

三、使用期間該注意些什麼？

藥名	注意事項
伯基 阿斯匹林 皇佳	不可使用於兒童或二十歲以下青少年之水痘或流行性感冒之症狀解除。蠶豆症患者不宜使用含水楊酸類藥品。
利血達	剛開始用藥及最初三個月內，建議抽血追蹤血球計數。
保栓通 舒栓寧	不建議使用於兒童或 18 歲以下的青少年。
百無凝	受限於文獻資料不足，授乳婦應審慎使用。 無法確認兒童使用之安全性與有效性。

任何手術、拔牙等處置，應先告知醫師以評估停藥天數，以減少出血風險！

四、可能引起的副作用？

藥名	副作用
伯基 阿斯匹林 皇佳	胃腸不適、腹瀉、過敏、皮膚出疹、胃腸出血、或瘀青、頭暈、耳鳴及頭痛等。
利血達	胃腸不適、嘔吐、食慾不振、或出血等相關情形。少部份病人血液中白血球可能減少；初期會產生發熱、發冷、喉嚨痛、疲倦感等症狀。
保栓通 舒栓寧	胃腸不適、頭痛、暈眩、身體出現任何異常出血或瘀青、傷口不易止血等。
百無凝	呼吸困難、頭痛、咳嗽、頭暈、噁心、高血壓、腹瀉、疲勞、胸痛。

若症狀嚴重且持續未改善，請告知醫師或藥師！

五、忘記使用怎麼辦？

想起時，立即服用；若已接近或已到下一次的服藥時間，只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。

*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，
請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604 或 5605