



臟得樂 Amiodarone 用藥指導單張

藥衛 012

學名	英文商品名	中文商品名	劑量	圖片
Amiodarone	Cordarone	臟得樂	200mg	

一、為什麼要使用這些藥？

Amiodarone 可用來治療和預防某些心臟節律失調的疾病(心律不整)。

二、使用這些藥品，有哪些情形該事先告知醫師？

- 如果您曾經對碘或Amiodarone，或本藥其他任一成份過敏。
- 如果目前或是曾有甲狀腺疾病。
- 為了避免多種藥物之間交互作用，如有服用其他任何藥物，應先告知醫師或藥師。
- 任何手術或拔牙前，請告知醫師或牙醫師正在接受服用本藥。
- 孕婦或有計畫懷孕的婦女。
- 如果正在哺育母乳。

三、使用期間該注意些什麼？

- 請避免非必要或長時間暴露於陽光下，並請穿保護性的衣物，戴太陽眼鏡和擦防曬乳液。Amiodarone 會讓您的皮膚對陽光敏感。
- 如出現不尋常的無法呼吸、呼吸困難或乾咳，不論其是否伴隨整體健康狀態的變壞，請立刻通知醫師。
- 如出現不尋常的疲倦或長期性或無法解釋的發燒、腹瀉、體重減輕、肌肉痛、視力受損或心悸的復發，都應告知醫師。
- 任何手術或拔牙前，請告知醫師或牙醫師正在接受服用本藥。
- 治療期間應定期回診做抽血檢驗，以監測甲狀腺或肝功能。

四、可能引起的副作用？

雖然 amiodarone 導致的副作用並不常見，但還是可能發生。

若有以下任何症狀發生嚴重的情形或無法消除時，請盡快告知您的醫師：極度疲倦、震顫和不自主的運動、協調性不佳、胃不舒服、嘔吐、便秘、食慾不振、視力改變(物體周圍有光圈，對光敏感或眼睛乾澀)、皮膚敏感。

若您有下列任一症狀，請立刻通知醫師：胸痛、呼吸急促(尤其在運動時)、心搏過快

或不規則。

五、忘記使用怎麼辦？

想起時，立即服用；若已接近或已到下一次的服藥時間，只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。

六、此藥儲存時的條件為何？

將藥物儲存在室溫，遠離高溫、高溼度（不要放置於浴室）和直接的陽光照射，並置於小孩拿不到的地方。將過期或不再需要的藥物送回附近藥局檢收。請教藥師如何適當地處理此藥。

*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，
請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604 或 5605