


## 移護寧 Azathioprine 服藥須知

藥衛 010

| 學名           | 英文商品名  | 中文商品名 | 劑量   | 圖片  |
|--------------|--------|-------|------|---|
| Azathioprine | Imuran | 移護寧   | 50mg |  |

一、作用：合併其他藥物用來預防器官排斥。

二、用法：請依照醫師指示劑量及次數服用。

三、注意事項：

1. 如果您因為高尿酸或痛風問題在非移植醫師處看診時，務必提醒醫師不能並用 Allopurinol (Tonsaric<sup>®</sup>)，非用不可時需回移植門診請醫師調整移護寧劑量。
2. 請定期回診監測血球數。服用此藥會使您抵抗力較弱，若有類似感冒或感染症狀 (如發燒、喉嚨痛、發冷、頻尿等)，請與協調師聯絡。為降低感染的機會，避免與生病或感染的人接觸，並養成常洗手等良好衛生習慣。
3. 藥品請貯存於 25°C 以下，避光保存。
4. 若發生食慾降低、噁心、嘔吐、腹瀉等腸胃不適，請與食物服用以減少症狀。

\*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，  
請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604 或 5605