



## 山喜多/睦體康 Mycophenolate 服藥須知

藥衛 008

學名	英文商品名	中文商品名	劑量	圖片
Mycophenolate	Cellcept	山喜多	250mg	
Mycophenolate	Myfortic	睦體康	180mg	

一、作用：合併其他藥物用來預防器官排斥。

### 二、用法：

1. 一天口服二次（早晚九點各一次），依照醫師處方的藥量及次數服用。
2. 山喜多請整顆吞服，以免將膠囊內的粉末吸入或與皮膚黏膜直接接觸。
3. 為保持腸溶膜衣的完整性，睦體康需整粒吞服，不可磨碎服用。

### 三、注意事項：

1. 此藥可能使你的皮膚對陽光更加敏感。大太陽外出時請做好防曬準備(如抹防曬乳液、穿著長袖衣服、戴帽子、撐陽傘等)。避免在陽光下逗留了很長一段時間，以免過度暴露於紫外線 (UV)。
2. 請定期回診監測血球數。服用此藥會使您抵抗力較弱，若有類似感冒或感染症狀(如發燒、喉嚨痛、發冷、頻尿等)，請與協調師聯絡。為降低感染的機會，避免與生病或感染的人接觸，並養成常洗手等良好衛生習慣。
3. 腹瀉為常見的副作用，若發生拉肚子可能影響所有抗排斥藥的吸收，請與協調師聯絡。
4. 此藥有增加胎兒發生先天性畸形的風險，建議在治療過程中採用有效的避孕方式，否則縱使是子宮切除、有不孕史的病人也應採用有效的避孕方式。

\*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，  
請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604 或 5605