



## 新體睦軟膠囊 Cyclosporine 服藥須知

藥衛 005

學名	英文商品名	中文商品名	劑量	圖片
Cyclosporine	Neoral	新體睦軟膠囊	25 mg	
Cyclosporine	Neoral	新體睦軟膠囊	100 mg	

一、作用：合併其他藥物用來預防器官排斥。

二、用法：

1. 一天口服二次（早晚九點各一次），依照醫師處方的藥量及次數服用。用餐時間與服藥時間需固定，以減少對藥品吸收的影響。
2. 膠囊可直接用水或其它飲料吞服（不能使用葡萄柚汁），一定要整粒吞服。

三、注意事項：

1. 請貯存於 25°C 以下的室溫中，勿放入冰箱中或車廂內。膠囊需置於原鋁箔包裝中直到需要服用時才可以撥開。打開鋁箔可聞到特定的氣味，是正常的並非顯示膠囊變質。
2. 藥物會分泌至乳汁中，接受治療的母親不可哺餵母乳。
3. 許多西藥、中草藥(含中草藥食物，如薑母鴨、羊肉爐等)、保健食品、會影響新體睦的藥效，使用新的藥物或保健食品前，請先告知協調師。
4. 飲食後應刷牙，使用牙線清潔牙齒，並每六個月定期看牙醫，如有牙齦腫大的情形要主動告訴醫師。
5. 此藥可能使你的皮膚對陽光更加敏感。大太陽外出時請做好防曬準備(如抹防曬乳液、穿著長袖衣服、戴帽子、撐陽傘等)。避免在陽光下長時間曝曬、逗留很長一段時間，以免過度暴露於紫外線 (UV)。
6. 避免吃葡萄柚或喝葡萄柚汁。只要飲用一杯 240ml 葡萄柚汁，四小時內即會影響藥物，而這種作用將會持續三天之久。因此，若只是將喝葡萄柚汁及服藥的時間分開，例如早上吃藥，晚上喝果汁，影響仍然存在。
7. 為使藥品達到最佳療效及減少副作用發生，請定期回診監測肝、腎功能及藥物濃度。

\*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，  
請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604 或 5605