




## 耐絞寧 NTG (Nitrostat) 用藥指導單張

藥衛 069

學名	英文商品名	中文商品名	劑量	圖片
Nitroglycerin	Nitrostat	耐絞寧	0.6 mg	

### 一、為什麼要使用這些藥？

狹心症(心絞痛)之治療及預防。

### 二、如何使用這個藥？

1. 應隨身攜帶耐絞寧。
2. 當急性心絞痛第一徵象發作時，迅速將一粒耐絞寧<sup>®</sup>錠至舌下或口腔頰中，使其溶化吸收。在症狀緩解前，若血壓正常可每隔五分鐘重複服用一粒。若在 15 分鐘內服用 3 粒後仍舊疼痛則應立即就醫。若路途較遠或服藥後症狀仍持續，請於服用完第一顆藥後，應立即就醫。
3. 耐絞寧<sup>®</sup>作為預防使用時，應在從事可能引起心絞痛發作的活動前 5~10 分鐘服用。
4. 急性心絞痛發作時，最好休息並採取坐姿服用。

### 三、使用期間該注意些什麼？

1. 對耐絞寧或其成分或其他硝酸鹽(nitrates)或亞硝酸鹽(nitrites)過敏之患者，禁止使用。
2. 使用時最好坐下，以免因頭暈而跌倒。用藥後可能立即發生頭痛(可能很嚴重)之現象。這種頭痛可能是本藥在患者體內產生作用的指標。
3. 使用藥品後，若有眩暈、虛弱、心跳加快現象，請到安全的地方坐下；若狀況未改善，請迅速就醫。
4. 服藥期間應避免從事可能如開車或操作機器等有危險的工作。
5. 若出現視力模糊或口乾現象應停藥。
6. 不可與 sildenafil citrate (Viagra<sup>®</sup>〔威而鋼<sup>®</sup>〕、Cialis<sup>®</sup>〔犀利士<sup>®</sup>〕、Levita<sup>®</sup>〔樂威壯<sup>®</sup>〕) 併用。
7. 若有持續頭痛，起皮疹，或胸痛頻率仍未改善，請回診時與醫師討論。
8. 當血壓過低時，可能會加重低血壓的情形，應避免。

#### 四、可能引起的副作用？

可能會發生頭痛、眩暈、頭暈、虛弱、心悸及低血壓等。

#### 五、此藥儲存時的條件為何？

1. 請盡量保持乾燥，勿將藥品倒出或分裝。
2. 勿將藥品攜入蒸汽浴室或溫泉。
3. 耐絞寧應放在原包裝之褐色玻璃瓶內(可避光)，避免潮濕或貼身存放，用後立即關緊瓶蓋，置於室溫下(15°C-30°C) 陰涼處保存。
4. 請在瓶身註明開瓶日期，開瓶後僅可儲存六個月。

\*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，  
請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604 或 5605