


博力寧 Prednisolone 服藥須知

藥衛 009

學名	英文商品名	中文商品名	劑量	圖片
Prednisolone	Prenin	博力寧	5mg	

一、作用：

屬於一種皮質類固醇，與其它藥一起使用，預防器官移植病人之排斥作用。

二、用法：

1. 每天服藥一次，請在每天早餐定時服藥；每二天服藥一次，請在隔天早餐時服用，並固定在單日或雙日服藥。
2. 請於早餐後服用藥物，若發生腸胃不適症狀（如噁心、嘔吐、胃有刺激感覺）時，可將藥物與與食物一起服用來減輕症狀。

三、注意事項：

1. 未經醫師同意不可任意停藥；如果突然停藥可能會造成食慾降低、噁心、嘔吐、想睡、恍惚、頭痛、發燒、關節痛、肌肉痛、脫皮、體重降低等。
2. 糖尿病患者在家請增加血糖測定次數，並將數值告訴醫師，做為藥物調整之參考。
3. 使用止痛消炎藥或過去有胃腸潰瘍病史者，用藥時請注意腸胃不適，如有嚴重胃痛、大便變黑或紅色，請與協調師聯絡。
4. 移植術後初期需使用較高劑量的博力寧，隨時間會逐漸降低劑量。
5. 此藥可能會增加食慾，請注意熱量攝取，以免體重快速增加。
6. 這種藥可能導致骨骼問題，如骨質疏鬆症，若發生骨頭疼痛請告訴醫生。

*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604 或 5605