



普樂可復 Tacrolimus 服藥須知

藥衛 007

學名	英文商品名	中文商品名	劑量	圖片
Tacrolimus	Prograf (FK506)	普樂可復	5mg	
Tacrolimus	Prograf (FK506)	普樂可復	1mg	
Tacrolimus	Prograf (FK506)	普樂可復	0.5mg	

一、作用：合併其他藥物用來預防器官排斥。

二、用法：

1. 一天口服二次（早晚九點各一次），依照醫師處方的藥量及次數服用。
2. 膠囊可直接用水或其它飲料吞服（不能使用葡萄柚汁）。

三、注意事項：

1. 藥物會分泌至乳汁中，接受治療的母親不可哺餵母乳。
2. 許多西藥、中草藥(含中草藥食物，如薑母鴨、羊肉爐等)、保健食品會影響普樂可復的藥效，使用新的藥物或保健食品前，請先告知協調師。
3. 此藥可能使你的皮膚對陽光更加敏感。大太陽外出時請做好防曬準備(如抹防曬乳液、穿著長袖衣服、戴帽子、撐陽傘等)。避免在陽光下逗留了很長一段時間，以免過度暴露於紫外線 (UV)。
4. 為使藥品達到最佳療效及減少副作用發生，請定期回診監測肝、腎功能及藥物濃度，並常測量血壓及血糖。
5. 本藥可能干擾視覺和神經系統，在確定此藥對您的影響前，應避免開車及操作危險機械。
6. 避免吃葡萄柚或喝葡萄柚汁。只要飲用一杯 240ml 葡萄柚汁，四小時內即會影響藥物，而這種作用將會持續三天之久。因此，若只是將喝葡萄柚汁及服藥的時間分開，例如早上吃藥，晚上喝果汁，影響仍然存在。

*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，
請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604 或 5605