




克流感 Tamiflu 用藥指導單張

藥衛 067

學名	英文商品名	中文商品名	劑量	圖片
Oseltamivir	Tamiflu	克流感	75 毫克	

一、為什麼要使用這些藥？

克流感是一種神經氨酸抑制劑，它能預防或治療流感，正確使用可縮短病程、減輕症狀的嚴重度及減少併發症的發生。

二、如何使用這個藥？

在流感症狀開始後 48 小時內服用效果最好，所以當出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛、頭痛等症狀時，應儘速就醫。若為流感重症病患或出現危險徵兆者，即使症狀出現時間已經超過 48 小時，還是可以服用。應依醫師指示服用藥物，通常一個療程劑量為每日投藥 2 次，連續投藥 5 日，停藥後即不具預防及治療效果，故仍有再次患病而需服藥之可能。

三、使用期間該注意些什麼？

1. 流感抗病毒藥劑為處方用藥，需經醫師評估後使用，若毫無節制使用抗病毒藥劑，有可能產生抗藥性的病毒株，延誤就醫時機。
2. 由於引起類流感症狀之病原體很多，流感抗病毒藥劑僅能治療流感病毒引起之感染症狀，因此須經由醫師診療確立病情後，再依指示服藥。

四、可能引起的副作用？

服用克流感引起的副作用雖不常見，但還是可能發生。若有以下症狀發生請立即通知醫師或藥師：行為及感覺異常、幻覺、嗜睡或意識障礙。若有下列症狀惡化情況或無法緩解時，請盡快通知醫師或藥師：咳嗽、聲音沙啞、喉嚨痛、頭暈、噁心、腹瀉、鼻塞、流鼻水。

五、克流感應該飯後或飯前吃？

空腹或餐後服用克流感都可以，若有腸胃不適（噁心、嘔吐）的感覺可與食物併服。按照醫師指示正確地服用克流感能夠縮短病程、減輕及症狀的嚴重度及減少併發症的發生；自行胡亂投藥不僅達不到治療效果還可能產生副作用。

六、孕婦或正在哺乳的媽媽可以服用嗎？

雖然在懷孕婦女試驗方面，還未有相關的研究結果，在考量用藥好處大於風險時，醫師可能建議您使用。若醫師開立克流感，建議依醫師指示使用。目前已知克流感會經由乳汁分泌，因此用藥期間不建議哺乳。

若您已懷孕或計畫懷孕，或在服藥期間懷孕，正在哺育母乳，請您就診時務必告知，請醫師審慎評估。

七、此藥儲存時的條件為何？

請保存於室溫下及孩童無法取得之處。

*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，
請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604 或 5605