

## 威而鋼錠 Viagra 用藥指導單張

藥衛 042

學名	英文商品名	中文商品名	劑量	圖片
Sildenafil	Viagra	威而鋼錠	100 mg	
Sildenafil	Viagra ODT	威而鋼口溶錠	50mg	

### 一、為什麼要使用這些藥？

改善男性勃起障礙。

### 二、如何使用這個藥？

1. 一般使用方法為行為發生前約 1 小時服用。
2. 口溶錠使用方式：將藥品置於口中舌面上，待溶散後再用水送服，或不用水直接吞服。自鋁箔泡殼中取出後應立即服用。對須服用第二錠的病人，應於第一錠完全溶散後再服用第二錠。

### 三、使用期間該注意些什麼？

1. 威而鋼不適用於女性及小孩。
2. 對威而鋼有過敏現象請勿使用本劑。
3. 不可與其他硝酸鹽類心臟血管藥物同時使用。
4. 有下列疾病或症狀者，請先告知醫師：近三至六個月中有心臟病發作、視網膜病變、肝臟功能不全或低下。
5. 有使用抗病毒藥物或其他心臟血管藥物時，請先告知醫師。
6. 陰莖持續勃起超過四個小時，或出現不尋常之肌肉疼痛及視力減退時，請迅速就醫。

### 四、可能引起的副作用？

畏光、頭暈、頭痛、陰莖脹痛或持續性勃起。

### 五、此藥儲存時的條件為何？

請置於室溫陰涼乾燥處避光儲存，勿放置於孩童可以取得的場所。

\*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，  
請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604 或 5605